

## Etude KBP-2000-CPHG

Tableau 4 : Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Patient</b>								
Age en années	n=639 64,5±10,9	n=417 63,7±10,7	n=595 63,0±11,9	n=1099 62,6±11,7	n=1792 63,9±11,0	n=217 70,9±10,7	n=686 66,3±12,4	0,0002
Age en classes								0,0006
≤ 40 ans	0,9	0,7	2,2	1,9	1,7	0,9	2,2	
≤ 50 ans	11,4	8,6	16,8	15,4	11,5	4,6	11,8	
51-60 ans	24,1	31,2	21,5	26,0	22,5	9,7	14,4	
61-70 ans	29,7	29,5	30,3	28,0	34,2	28,1	30,5	
71-80 ans	28,6	24,9	23,2	24,6	25,6	41,0	31,5	
> 80 ans	5,2	5,0	6,0	4,1	4,6	15,7	9,6	
Sexe	n=639	n=417	n=595	n=1099	n=1793	n=217	n=688	<0,0001
Hommes	90,9	83,5	82,2	81,2	94,9	88,5	55,4	
Femmes	9,1	16,5	17,8	18,8	5,1	11,5	44,6	
Région FT	n=639	n=417	n=595	n=1099	n=1793	n=217	n=688	<0,0001
0-DOM-TOM	1,6	1,4	1,5	2,6	3,2	5,5	3,3	
1-Ile-de-France	18,0	22,5	19,5	18,7	14,3	3,7	14,5	
2-Nord-Ouest	21,9	17,8	22,5	21,2	19,7	27,2	22,4	
3-Nord-Est	26,6	26,9	31,1	30,8	44,8	23,0	24,4	
4-Sud-Est	21,7	18,9	14,5	16,2	12,0	19,8	28,1	
5-Sud-Ouest	10,2	12,5	10,9	10,5	6,0	20,7	7,3	
<b>Tabagisme</b>								
Statut tabagique	n=636	n=413	n=593	n=1095	n=1781	n=215	n=674	<0,0001
Non fumeur	5,0	7,3	7,4	6,2	3,0	12,1	19,1	
Ex-fumeur	47,0	40,9	42,5	40,4	39,7	48,8	32,2	
Fumeur	48,0	51,8	50,1	53,4	57,3	39,1	48,7	

Tableau 4 : Suite Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Tabagisme</b>								
Fumeurs actuels et Ex-fumeurs	n=599	n=378	n=546	n=1017	n=1713	n=186	n=526	
Nombre de paquets-année	44,9±20,7	42,1±18,0	43,0±22,6	43,3±20,1	45,6±22,0	40,3±19,8	46,2±23,2	<0,0001
Paquets-année en classes								0,0002
≤ 20 paquets-année	12,5	11,9	13,7	13,2	11,0	21,5	12,6	
21-40 paquets-année	40,1	47,6	45,8	40,6	42,8	37,1	38,8	
41-60 paquets-année	31,9	31,5	28,8	33,9	31,7	33,3	34,8	
60 paquets-année	15,5	9,0	11,7	12,3	14,5	8,1	13,9	
Ex-fumeurs	n=298	n=167	n=250	n=434	n=699	n=103	n=210	
Nombre de paquets-année	42,1±22,1	37,7±16,5	40,0±21,7	40,6±20,0	42,3±21,6	36,4±18,5	42,6±23,2	0,03
Durée de la consommation en années	n=294	n=164	n=242	n=427	n=682	n=101	n=206	
	34,6±11,5	33,9±10,9	35,1±11,2	35,2±11,7	36,5±11,2	36,7±12,1	36,3±13,1	0,046
Durée de la consommation en classes								0,09
≤ 20 ans	19,1	16,5	14,1	15,5	12,5	15,8	17,0	
21-30 ans	24,1	31,1	29,8	26,0	24,5	18,8	23,3	
31-40 ans	30,6	34,8	32,6	31,6	32,0	35,6	28,2	
41-50 ans	21,1	14,0	16,5	21,5	24,3	23,8	21,4	
> 50 ans	5,1	3,7	7,0	5,4	6,7	5,9	10,2	
Ex-fumeurs	n=294	n=162	n=240	n=428	n=685	n=103	n=208	
Durée de l'arrêt en années	11,9±9,8	11,4±8,9	10,9±9,4	11,1±9,9	10,8±9,7	13,3±10,7	12,4±11,1	0,11
Durée de l'arrêt en classes								0,18
≤ 5 ans	32,0	35,8	37,9	39,7	40,6	31,1	32,2	
6-10 ans	24,5	21,0	22,9	19,9	20,1	20,4	26,9	
11-20 ans	29,2	25,9	26,7	24,3	24,8	25,2	22,6	
> 20 ans	14,3	17,3	12,5	16,1	14,5	23,3	18,3	
Fumeurs actuels	n=301	n=211	n=296	n=583	n=1014	n=83	n=316	
Nombre de paquets-année	47,7±18,8	45,7±18,3	45,6±23,1	45,3±19,9	48,0±22,1	45,1±20,3	48,6±22,9	0,09
Durée de la consommation en années	n=290	n=199	n=283	n=566	n=967	n=77	n=301	
	38,2±10,5	38,0±10,8	36,7±11,6	37,6±11,1	39,4±11,1	44,8±11,9	38,6±11,7	<0,0001

Tableau 4 : Suite Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Tabagisme</b>								
Fumeurs actuels (suite)								
Durée de la consommation en classes								0,0001
≤ 20 ans	6,2	8,0	11,3	7,4	6,6	1,3	9,0	
21-30 ans	25,9	25,1	26,9	27,7	22,4	19,5	27,2	
31-40 ans	36,5	36,2	30,4	33,4	32,4	24,7	29,2	
41-50 ans	22,8	20,6	24,4	20,9	25,9	26,0	22,6	
> 50 ans	8,6	10,1	7,1	10,6	12,7	28,6	12,0	
<b>Recrutement</b>	n=638	n=416	n=593	n=1098	n=1789	n=216	n=682	0,002
Patient venu de lui-même	6,6	7,0	4,9	3,9	4,2	1,8	3,8	
Autre personne (Famille)	0,2	0	0,2	0,4	0,3	0	0,4	
Médecin généraliste	63,8	54,1	57,0	61,0	59,5	60,7	54,4	
Médecin du travail	0,3	0,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,3	
Pneumologue	8,0	11,5	13,0	10,6	11,7	7,9	14,1	
Autre médecin	19,7	24,8	22,9	22,0	21,4	26,8	26,0	
Associations (médecins)	1,4	2,4	1,5	1,6	2,0	2,3	1,0	
<b>Performance status</b>								
A l'entrée, %	n=639	n=417	n=594	n=1099	n=1791	n=217	n=684	<0,0001
Activité normale	31,5	36,0	35,7	28,9	23,7	16,1	20,8	
Activité physique intense réduite	39,0	33,3	34,3	39,9	38,7	47,5	35,7	
Actif > 50% des heures d'éveil	17,5	14,6	14,3	16,1	19,2	16,1	20,3	
Assis / alité > 50% heures d'éveil	10,3	13,2	13,3	11,9	16,0	15,7	17,1	
Incapacité totale	1,7	2,9	2,4	3,2	2,4	4,6	6,1	

Tableau 4 : Suite Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Diagnostic</b>								
Délai entre le 1 <sup>er</sup> symptôme et le prélèvement ayant permis le diagnostic histologique	n=606	n=390	n=561	n=1051	n=1684	n=208	n=641	
en jours	74,6±121,0	74,4±131,6	77,5±137,0	79,1±128,7	70,5±101,9	81,9±99,9	65,8±82,3	0,21
en classes, %								0,046
< 7 jours	5,0	8,0	6,1	5,1	8,4	7,7	8,7	
7-30 jours	28,0	26,9	27,1	30,1	29,4	27,9	29,8	
31-60 jours	28,1	26,7	25,7	24,4	23,9	18,8	25,9	
61 jours-6 mois	32,3	32,0	34,6	31,9	31,1	36,1	29,0	
> 6 mois	6,6	6,4	6,6	8,6	7,2	9,6	6,6	
Délai entre la radio pulmonaire et le prélèvement ayant permis le diagnostic histologique	n=629	n=405	n=586	n=1074	n=1758	n=215	n=671	
en jours	35,0±107,6	31,5±73,3	37,1±125,3	28,2±59,3	30,6±71,1	32,7±71,8	29,4±57,3	0,36
en classes, %								0,78
≤ 3 jours	14,3	15,1	16,5	16,0	17,3	18,1	16,2	
4-7 jours	16,7	17,3	15,4	19,5	18,0	19,1	19,1	
8 jours-30 jours	44,5	40,5	40,6	42,4	40,3	40,5	40,4	
31 jours-2 mois	14,0	15,6	15,5	12,5	14,1	11,2	13,7	
> 2 mois	10,5	11,6	12,0	9,6	10,3	11,2	10,6	
Mode de diagnostic	n=639	n=416	n=594	n=1098	n=1790	n=217	n=687	0,02
Biopsie bronchique	63,9	59,1	60,9	64,2	67,7	71,0	63,5	
Ponction transpariétale	13,0	15,9	15,2	14,0	12,5	14,8	12,5	
Médiastinoscopie	3,4	3,6	4,7	3,8	2,6	1,8	3,2	
Chirurgie curatrice	7,7	8,2	7,7	6,1	6,0	1,8	6,3	
Autre	12,0	13,2	11,5	11,8	11,2	10,6	14,6	

Tableau 4 : Suite Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Diagnostic</b>								
Mode de diagnostic (suite)								
Si autre,	n=68	n=54	n=61	n=116	n=193	n=21	n=91	0,46
Diagnostic au niveau								
du poumon	41,2	27,8	44,3	35,3	33,7	33,3	48,3	
Biopsie d'adénopathie	20,6	25,9	18,0	19,8	18,6	19,1	9,9	
Biopsie de métastase	25,0	31,5	22,9	25,0	28,0	19,0	25,3	
Diagnostic au niveau :								
- de la plèvre	10,3	14,8	14,8	19,8	17,6	28,6	15,4	
- du péricarde	2,9	0	0	0	2,1	0	1,1	
Site du prélèvement diagnostique	n=637	n=417	n=592	n=1097	n=1788	n=216	n=685	0,29
Tumeur	88,5	86,6	88,5	88,0	90,2	91,2	88,0	
Adénopathie	5,7	6,5	6,4	6,3	4,4	2,8	5,1	
Métastase	5,8	7,0	5,1	5,7	5,4	6,0	6,9	
<b>Type histologique</b>								
Cancer à petites cellules	n=631	n=413	n=591	n=1090	n=1771	n=213	n=673	0,16
non	82,7	84,3	83,9	84,5	81,5	86,4	85,4	
oui	17,3	15,7	16,1	15,5	18,5	13,6	14,6	
Si oui,	n=106	n=61	n=94	n=165	n=319	n=25	n=93	0,72
Localisé	38,7	27,9	34,0	36,4	31,0	32,0	32,3	
Diffus	61,3	72,1	66,0	63,6	69,0	68,0	67,7	
Type histologique (1 seule variable en 4 classes)								
Si cancer non à petites cellules	n=510	n=340	n=484	n=892	n=1412	n=182	n=554	<0,0001
Epidermoïde seul	50,0	38,5	39,1	45,3	54,3	59,3	45,5	
Adénocarcinome seul	34,7	43,2	43,8	40,4	30,4	26,9	38,6	
Grandes cellules seules	14,3	16,8	16,1	13,9	14,5	12,1	14,4	
Bronchio-alvéolaire seul	1,0	1,5	1,0	0,4	0,8	1,7	1,4	

Tableau 4 : Suite Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Stade (Cancer non à petites cellules)</b>								
Classification internationale en fonction des sous-groupes TNM								
Stade	n=498	n=321	n=470	n=885	n=1371	n=173	n=536	0,16
0	0,6	0	0,6	0,4	0,9	0	0	
IA	3,8	4,4	5,5	5,5	5,6	2,9	3,0	
IB	10,8	7,2	9,6	10,2	9,6	11,0	8,4	
IIA	0,8	0,9	0,4	0,8	0,8	2,3	0,6	
IIB	9,0	7,8	5,7	6,4	7,3	5,8	6,0	
IIIA	16,3	12,5	16,8	13,9	12,9	15,6	13,6	
IIIB	20,1	19,9	19,8	18,8	21,4	22,0	21,3	
IV	38,6	47,3	41,5	44,0	41,5	40,5	47,2	
<b>Stratégie thérapeutique de 1<sup>ère</sup> intention</b>								
Chimiothérapie	n=638	n=415	n=594	n=1098	n=1782	n=217	n=683	<0,0001
non	32,3	28,9	32,0	33,8	36,5	44,2	40,9	
oui	67,7	71,1	68,0	66,2	63,5	55,8	59,1	
Chirurgie	n=635	n=415	n=593	n=1098	n=1779	n=217	n=682	0,02
non	77,8	80,2	79,9	78,8	80,5	85,3	84,3	
oui	22,2	19,8	20,1	21,2	19,5	14,7	15,7	
Radiothérapie tumorale	n=637	n=412	n=588	n=1096	n=1775	n=217	n=682	0,43
non	79,1	80,6	81,3	78,3	79,9	77,0	81,2	
Curatrice	13,3	11,2	12,6	12,3	12,2	12,9	9,8	
Palliative	7,5	8,2	6,1	9,4	7,9	10,1	8,9	
<b>Stratégie thérapeutique de 1<sup>ère</sup> intention</b>								
Traitement (en 1 seule variable à 5 classes)								
	n=638	n=415	n=594	n=1099	n=1783	n=217	n=683	<0,0001
Aucun traitement	7,4	7,7	9,9	8,5	11,4	19,8	19,0	
Chimiothérapie seule	50,6	54,7	53,2	50,4	50,6	42,9	49,3	
Chirurgie seule	18,3	15,7	16,0	17,7	16,7	13,4	12,6	
Radiothérapie seule	5,8	4,8	5,2	6,5	7,5	10,6	7,0	
Associations	17,9	17,1	15,7	16,9	13,8	13,4	12,0	

Tableau 4 : Suite Comparaisons selon les catégories socio-professionnelles

	Artisan	Cadre	Profession intermédiaire	Employé	Ouvrier	Agriculteur	Sans profession	p
<b>Stratégie thérapeutique de 1<sup>ère</sup> intention</b>								
Traitement mis en oeuvre	n=637	n=413	n=590	n=1094	n=1776	n=217	n=680	<0,0001
non	17,7	14,8	14,9	17,5	20,3	29,5	29,4	
oui	80,7	84,3	83,2	80,5	77,8	67,7	68,2	
ne sait pas	1,6	1,0	1,9	2,0	1,9	2,8	2,4	
<b>Protocole</b>								
Patient inclus dans un protocole de recherche clinique								
	n=638	n=415	n=593	n=1094	n=1788	n=216	n=683	0,03
non	94,0	94,5	94,4	96,0	94,8	97,2	97,4	
oui	6,0	5,5	5,6	4,0	5,2	2,8	2,6	
<b>Maladie professionnelle</b>								
Etiologie professionnelle	n=637	n=415	n=593	n=1096	n=1787	n=217	n=681	<0,0001
non	90,1	95,2	94,8	89,7	82,9	97,7	97,1	
possible	9,0	3,9	4,4	8,7	14,9	1,8	2,6	
certaine	0,9	1,0	0,8	1,6	2,2	0,5	0,3	